



آموزش به بیمار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان اصفهان

زخم قرنیه

کد پمفلت PAL-E-07-0001

بافت شفاف جلوی چشم را قرنیه می گویند .

زخم قرنیه، در اثر درگیری عفونی بافت قرنیه ایجاد می شود که معمولاً با درد ، قرمزی و تاری دید و گاهی با ترشح زیاد همراه می باشد.

*در صورت بروز علائم درد، قرمزی ، تاری دید و ترشح به چشم پزشک مراجعه نمایید.
درمان :

* جهت درمان بیماری قطره تجویز می شود که قطره ها به صورت ترکیبی یا تغلیظ شده آنتی بیوتیک ها می باشد که باید پی در پی در طور شبانه روز مصرف شود .

* دستور قطره معمولاً روز اول هر یک ساعت و در هنگام خواب شبانه هر دو ساعت می باشد .

* معمولاً بیمار بستری می شود و ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد .

* مهم ترین نکته در خصوص جراحی جهت اولسر قرنیه این است که معمولاً جراحی برای

حفظ دید است نه جهت بهتر شدن دید بیمار

*درمان دارویی فقط جهت دید و حفظ چشم می باشد.

*مدت زمان بهبودی زخم قرنیه گاهی تا چند ماه به طور می انجامد که نیاز به صبر و حوصله می باشد .

واحد آموزش سلامت بیمارستان سیدالشهداء(ع) سمیرم