

کاوازاکی

یک بیماری نادر دوران کودکی میباشد
معمولا کودکان زیر ۵ سال را درگیر میکند
در پسران شایع است
در اواخر زمستان و بهار بیشتر دیده میشود
این بیماری ارثی میباشد قابل پیشگیری نیست
و قابل سرایت به دیگران نیز نیست

تعریف کاوازاکی :

بیماری با علت ناشناخته میباشد که باعث
التهاب عروق خونی (بخصوص عروق
کوچک و متوسط) در سرتاسر بدن میشود

علت ایجاد بیماری ناشناخته است ولی احتمال
میدهند منشا عفونی داشته باشد و به دنبال
افزایش پاسخ سیستم دفاعی یا پاسخ نامناسب
آن به عوامل عفونی (ویروسها باکتری ها
)باشد که این پاسخ نامناسب باعث التهاب
عروق خونی سراسر بدن و تخریب عروق
خونی میشود



علائم بیماری :

تب مداوم بالای ۳۹ درجه سانتی گراد که به آنتی
بیوتیک جواب نداده و بیش از ۵ روز طول بکشد

قرمزی هر دو چشم ها

ورم و قرمزی کف دستها و کف پاها که درد ناک
مییابد

دانه های قرمز روی شکم سینه و دستگاه تناسلی
ورم کردن غدد لنفاوی گردن که دردناک نیز
مییابد و یک طرفه است

قرمزی خشکی و ترک خوردگی لب ها

ورم زبان و سفید شدن و برآمدگی های بزرگ
روی زبان (زبان توت فرنگی)

تشخیص

تشخیص این بیماری مشکل است زیرا هیچ گونه
آزمایشی برای تشخیص آن وجود ندارد

در صورت وجود نشانه زیر تشخیص کاوازاکی
داده میشود

-کودک شما بیش از ۵ روز تب داشته باشد

-کودک شما حداقل ۴ مورد از موارد گفته شده

را داشته باشد

-نوار قلب و اکوکاردیوگرافی معمولا برای
بررسی درگیری قلب و عروق انجام میشود

درمان

همه کودکان مبتلا به کاوازاکی باید در
بیمارستان بستری شوند

تزریق ایمنوگلوبین داخل وریدی این دارو به
بدن کمک میکند تا با عفونت مبارزه کند و
التهاب رگ های خونی را کاهش دهد

آسپرین به کاهش تب و درد کمک میکند و
احتمال لخته خون را کاهش میدهد

استفاده از آنتی اسید

با تشخیص و درمان زود هنگام احتمال ایجاد
مشکلات قلبی کاهش پیدا میکند

آموزش به والدین

از رژیم غذایی نرم و مایعات که خیلی سرد و
گرم نباشد استفاده کند

کودک شما ممکن است خسته شود و گریه کند
و پوست خشک داشته باشد از لوسیون برای
نرم و مرطوب کردن استفاده شود

بسم تعالی

راهنمای خود مراقبتی کاوازاکی



کد پمفلت: **PAL-MATE-46-0001**

تهیه و تنظیم: زهره قاسمی

زمستان ۱۴۰۲



در صورت علائم مسمومیت با آسپرین شامل سرگیجه و سردرد و وزوز گوش کیبودی بی دلیل خلط خونی خون در مدفوع به پزشک مراجعه کنید

با انجام آزمایشات و معاینات بعدی که پزشک برای کودکان تجویز میکند به شما و پزشک کمک میکند تا در مورد نبود مشکلات قلبی مطمئن شوید



منابع: پرستاری کودکان ونگ سونیا آرزومانیان

درمان قدم به قدم بیماریهای کودکان تالیف آقای دکتر محمد رضا اشرفی



درد مفاصل تا چند هفته ادامه دارد

از تزریق واکسن های حاوی ویروس زنده ضعیف شده تا ۱۱ ماه پس از دریافت ایمنوگلوبولین وریدی خودداری کنید

در صورت تب بالای ۳۸ درجه سانتی گراد در منزل به پزشک اطلاع دهید

در صورت درد قلب گرفتگی قفسه سینه اندام های سرد و رنگ پریده درد شکم بیقراری تهوع به پزشک مراجعه کنید

مصرف آسپرین در خانه و پس از ترخیص از بیمارستان ممکن است ادامه داشته باشد

آسپرین در کودکانی که در عروق قلب آنها مشکلی ایجاد نشده باشد تا چند هفته تجویز میشود اما در کودکانی که در اکوکاردیوگرافی قلب و معاینه قلب آنها مشکلاتی به وجود آمده باشد برای مدت طولانی تری تجویز میشود

چند نکته در باره مصرف آسپرین

مصرف آسپرین فقط با دستور پزشک میباشد مصرف خود سرانه آن خود داری کنید

اگر کودک شما حین مصرف آسپرین در معرض بیماری آنفلونزا یا آبله مرغان قرار گرفت به پزشک مراجعه کنید

