

ریوارکسابان

ریوارکسابان برای جلوگیری از تشکیل لخته استفاده می شود لخته ای که در اثر بعضی از بی نظمی های قلبی یا بعد از جراحی زانو یا لگن ایجاد میشود. همچنین برای درمان بیماریهایی مانند (ترومبوز وریدهای عمقی یا آمبولی ریوی) و برخی مواقع هم جهت جلوگیری از تشکیل مجدد لخته استفاده می شود

قرص ها به شکل ۲.۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ میلی گرمی دیده می شوند. دارو را منظم مصرف کنید

- شرایط نگهداری:

۱- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

۲- دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

۳- از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری کنید

نکات مراقبتی لازم که هنگام مصرف دارو باید بدانید:

- قرص را با غذا مصرف کنید

- اگر نمی توانید دارو را ببلعید، قرص را خرد کنید و همراه با آب سبب بخورید. این کار را فقط برای مصرف همان لحظه انجام دهید

- اگر شما از طریق لوله ی وارد شده به معده قرص را مصرف می کنید، از پزشک خود بپرسید که چگونه این کار را انجام دهید.

- دارو را منظم مصرف کنید تا بهترین اثر درمانی را داشته باشد. برای یادآوری بهتر، دارو را هر روز سر ساعت منظمی مصرف کنید.

- اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید، به پزشک خود اطلاع دهید. در بارداری ممنوع است



- قبل از استفاده از این دارو، سابقه ی پزشکی تان را به پزشک خود بگویید، مخصوصا اگر دچار بیماری کبدی، بیماری کلیوی، مشکلات خونریزی دهنده (مانند خونریزی دستگاه گوارشی، خونریزی مغزی)، سکتة مغزی، جراحی یا جراحی اخیر، بیماری های خونی (مانند کم خونی، هموفیلی، ترومبوسیتوپنی)، مشکل خاص چشمی، مشکلات ارثی آنزیمی (مانند عدم تحمل گالاکتوز، کمبود لاکتاز، مشکلات متابولیسم گلوکز و گالاکتوز) هستید.

دانستنی های قرص ریواروکسابان



کد پمفلت: PAL-PT-03-0001

تهیه کننده: مرضیه یاری، شهره نعمتی

بیمارستان سیدالشهداء سمیرم

مهر ۱۳۹۹-بازنگری ۱۴۰۲



-از فعالیت هایی مانند ورزش های درگیرانه اجتناب کنید. اگر دچار جراحت شدید، مخصوصا اگر دچار ضربه به سر شدید، سریعا با پزشک خود تماس بگیرید

-این دارو می تواند باعث ایجاد خونریزی شود. برای کاهش احتمال برش، کبودی یا جراحت از وسایل تیز و برنده مانند ریش تراش یا ناخن گیر با احتیاط استفاده کنید. برای تراشیدن ریش خود از ریشتراش برقی استفاده کنید



-انتقال این دارو از طریق شیردهی به کودک کاملا مشخص نیست، قبل از شیردهی به کودک خود با پزشکتان مشورت کنید.

-این دارو ممکن است باعث خونریزی معده شود. استفاده ی روزانه از الکل در طی استفاده از این دارو، خطر خونریزی ار معده را افزایش میدهد. استفاده از الکل را محدود کنید



اگر دچار استفراغ خونی یا مدفوع تیره رنگ یا خونریزی در هنگام اجابت مزاج داشتید حتما سریعا به پزشک مراجعه نمایید

-برای مسواک زدن از مسواک نرم استفاده



کنید

